

Progetto Fegato

Ipertransaminasemia in età pediatrica



Unità Operativa di Pediatria
e Adolescentologia
Dott. G.P. De Filippo

Premessa

Aumento dei reperti “incidentali” di ipertransaminasemia
(GOT e GPT sono abitualmente incluse nelle indagini di routine).

Quando richiedere un dosaggio delle transaminasi?

↗ - segni di epatopatia

↗ - rallentamento della velocità di crescita


↗ - diarrea cronica

↗ - dolori addominali ricorrenti

↗ si tratta molto spesso di diagnosi “a posteriori” e non rappresentano, *di per sé*, indicazioni a richiedere il dosaggio delle transaminasi.

Iter diagnostico

- Anamnesi:
- - ricercare una tossicità farmacologica (paracetamolo, ma praticamente tutti i farmaci di impiego comune)
- - epidemiologia (intossicazione alimentare)
- - ricostruzione della curva di crescita, valutazione del rendimento scolastico
- Storia familiare positiva per autoimmunità
- Obesità



Iter diagnostico

- Ricerca dei marcatori virali
- Ecografia epatica
- Bilirubina totale e coniugata, ALP, GGT
- Studio della coagulazione
- Elettroforesi delle proteine
 - albuminemia per l'anzianità della malattia
 - alfa1 globuline (picco assente nel deficit di alfa1 antitripsina)
 - gammaglobuline (aumentate nell'autoimmunità)

